



**TOPRAKTAN
GETİR**

Uygulama Programları

Önerilen uygulama programları, ortalama durumda olan bir arazi göze alınarak hazırlanmış uygulama programlarıdır.

Uygulama miktarları ve zamanları;

- toprak analizinize,
- arazinizin mevcut durumuna,
- bulunduğunuz iklime,
- kullandığınız diğer bitki besleme ürünlerine ve koruma ürünlerine

bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0850 885 02 18

Buğday Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Kardeşleme Dönemi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 Gr

Güz Dönemi

100 Litre su için;

- Nitrogen 300 ml

Sapa Kalkma Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g

ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 30 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stonomların açıldığı süreçte yapacağız.

Mısır Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



4-6 Yaprak

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 50 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

6-8 / 8-10 Yaprak

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 Gr

ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 40 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Yonca Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Kesim Arkası

Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 50 ml

ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 30 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Ayçiçeği Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



4-6 Yaprak

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

6-8 Yaprak

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g

ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 30 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Pamuk Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Tarak Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Elma Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g
- Combi Plus 50 g

ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 30 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Pancar Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 2 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Çıkıştan 15 gün sonra

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Patates Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 gr



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Soya Fasulyesi Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çıkiştan 15 gün sonra

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Fasulye Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün sonra üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Muz Sezon Uygulaması

Uygulamalar 10 gün ara ile yapılmalı ara uygulamalarda kullanılan dengeli vb. ürünleri yarı yarıya azaltabilirsiniz.

NOT: Terrabora Atak'a alternatif olarak 4 kg Terrabora Active kullanılabilir.



Köklenme Dönemi

Dönüme;

- Terrabora Atak 2 L
- AgroRun AminoWork 100 g
- Agrorun Power 200 g
- Sacax Köklendirici 500 ml
- Calsibor 200 ml
- Nitrogen 150 ml

Gövde ve Tarak Dönemi

Dönüme;

- Terrabora Atak 2 L
- AgroRun AminoWork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Combi Plus 200 g
- Agrorun Fosfor 50 ml
- Nitrogen 150 ml

Meyve Dönemi

Dönüme;

- Terrabora Atak 3 L
- AgroRun AminoWork 100 g
- Agrorun Power 150 g
- Potka Potasyum 100 ml
- Calsibor 100 ml
- Nitrogen 100 ml

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Nohut Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün sonra üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

İspanak Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çıkiştan

15 gün sonra

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 50 g

1. Uygulamadan

20 gün sonra

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 50 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Yer Fıstığı Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çıkıştan 15 gün sonra

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Patlıcan Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Çalı Dönemi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Bamya Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün sonra üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Bezelye Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:


- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Kabak Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi


İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Soğan Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Yaprak Uygulamaları

Çıkiştan 15 gün sonra

(15 gün ara ile 2 uygulama)

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Fosfor 100 ml
 - Combi Plus 100 g

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g
- 100 Litre su için;
- Agrorun Aminowork 100 g
 - Agrorun Power 100 g
 - Agrorun Rapidalg 100 g



ÖNEMLİ: Dekara inen su miktarı önemlidir. Yüksek verim için yaprak uygulamalarında ideal su uygulama miktarı 20 litredir.

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Marul Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active Atak 3 L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Sacax ve Active karıştırılarak ekim öncesi toprak hazırlığında ya da ekimi takiben 3 gün içerisinde üstten sıkarak uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.



Yaprak Uygulaması

(15 gün ara ile 2 uygulama)

Birinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 g

İkinci Yaprak Uygulaması

Dönüme:

- Terrabora Plus 200 g

100 Litre su için;

- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Domates Sezon Uygulaması

Damlama Uygulamaları

(10 gün ara ile 4 kez)

Ara sularda normal dengeli gübresini yarı yarıya azaltarak devam edebilir ancak meyvenin yumuşamaması için kalsiyumu kesinlikle kesilmemelidir.

1. ve 2. Damlamada

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ NOT: İlk damlamada dönüme 2 L sacax köklendirici gerekli olması durumunda girilebilir.

3. ve 4. Damlamada

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- AgroRun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g


Yaprak Uygulamaları

Birinci Yaprak uygulaması birinci damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra,

İkinci yaprak uygulaması dördüncü yani son damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra yapılmalıdır.

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Biber Sezon Uygulaması

Damlama Uygulamaları

(10 gün ara ile 4 kez)

1. ve 2. Damlamada

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml

3. ve 4. Damlamada

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g


Yaprak Uygulamaları

Birinci Yaprak uygulaması birinci damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra,

İkinci yaprak uygulaması dördüncü yani son damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra yapılmalıdır.

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 gr
- AgroRun Rapidalg 50 gr
- Combi Plus 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Salatalık Sezon Uygulaması

Damlama Uygulamaları

(10 gün ara ile 4 kez)

Ara sularda normal dengeli gübresini yarı yarıya azaltarak devam edebilir ancak meyvenin yumuşamaması için kalsiyumu kesinlikle kesilmemelidir.



Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 Gr

Yaprak Uygulamaları

Birinci Yaprak uygulaması birinci damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra,

İkinci yaprak uygulaması dördüncü yani son damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra yapılmalıdır.

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g
- Combi Plus 50 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Çilek Sezon Uygulaması

Damlama Uygulamaları

(10 gün ara ile 4 kez)

- Damlama uygulamaları 10 gün ara ile tek başına, herhangi bir ekleme yapmadan atılır.
- Damlama uygulamalarında ara uygulamalarda dengeli, azot, kalsiyum uygulamaları standart uygulama miktarlarından yarı yarıya azaltarak girilebilir.
- Kalsiyum kullanımı ayda bir, bir damlama bir üst uygulama olarak kullanılması tavsiye edilir.

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 200 g
- Agrorun Rapidalg 50 g
- Agrorun Fosfor 100 ml

Yaprak Uygulamaları

Birinci Yaprak uygulaması birinci damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra, İkinci yaprak uygulaması dördüncü yani son damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra yapılmalıdır.

Üst uygulamaları meyvenin yeşil dönemine denk getirilmesi tavsiye edilir.

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g
- Combi Plus 50 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Ahududu Sezon Uygulaması

Damlama Uygulamaları

(10 gün ara ile 4 kez)

- Damlama uygulamaları 10 gün ara ile tek başına, herhangi bir ekleme yapmadan atılır.
- Damlama uygulamalarında ara uygulamalarda dengeli, azot, kalsiyum uygulamaları standart uygulama miktarlarından yarı yarıya azaltarak girilebilir.
- Kalsiyum kullanımı ayda bir, bir damlama bir üst uygulama olarak kullanılması tavsiye edilir.

Dönüme;

- Terrabora Active Atak 2 L
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 200 g
- Agrorun Rapidalg 50 g
- Agrorun Fosfor 100 ml

Yaprak Uygulamaları

Birinci Yaprak uygulaması birinci damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra, İkinci yaprak uygulaması dördüncü yani son damlama uygulamasını takiben 3 gün sonra yapılmalıdır.

Üst uygulamaları meyvenin yeşil dönemine denk getirilmesi tavsiye edilir.

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Rapidalg 50 g
- Combi Plus 50 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Zeytin Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Combi Plus 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

100 L su için; 200 ml Doracop Bakır

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Zinbor 100 ml

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben 3 ile 7 gün arasında uygulanmalıdır.

100 L su için; 200 ml Doracop Bakır

Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Ceviz Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 150 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g
- Agrorun Fosfor 50 ml

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben 3 ile 7 gün arasında uygulanmalıdır.



Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Fındık Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 500 g/ocak başına

ÖNEMLİ: Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 50 ml
- Combi Plus 50 g

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben 3 ile 7 gün arasında uygulanmalıdır.



Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Üzüm Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 500 gr/bağ başına
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Damlama sisteminden taban uygulaması için;

- Terrabora Atak 3L/dönüm
- Sacax Köklendirici 500 ml/dönüm

Çiçek Öncesi

göz açılımı arkası

birinci yaprak uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 gr

Meyve Dönemi

ikinci yaprak uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr

Meyve Dönemi

ikinci yaprak uygulamasından 15 gün sonra

üçüncü yaprak uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Elma Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

100 L su için; 200 ml Doracop Bakır

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g
- AgroRun Fosfor 100 ml

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben bir hafta sonra uygulanmalıdır.

100 L su için; 200 ml Doracop Bakır



Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 200g
- Agrorun Rapidalg 100 g

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Şeftali Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;


- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 200 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Kayısı Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Badem Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

İncir Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolonların açıldığı süreçte yapacağız.

Antep Fıstığı Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Kiraz Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Çiçek Öncesi

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

Meyve Dönemi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 g



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Limon Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 gr

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben bir hafta sonra uygulanmalıdır.



Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Portakal Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.

Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 gr


ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben bir hafta sonra uygulanmalıdır.

Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr



Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.

Mandalina Sezon Uygulaması

Taban Hazırlığı

- Terrabora Active 0-15 yaş ağaçlarda, ağaç başına ve taç iz düşümüne 1,5 kg

NOT: Her 15 yaşta yarım kilo artırılır.

Taç iz düşümüne yapılan uygulamalarda üzerinden çapa makinesiyle geçilip toprağın 5 cm altına alınmalıdır.

- Damlama sistemi var ise dönüme 5 L Terrabora Active Atak ve 1 L Sacax Köklendirici uygulanır.

Tabanda kullanılan makro elementli gübre ile karıştırılıp atıldığı takdirde ise taban gübresinin ekstra çalışmasını sağlayacaktır.

Hasat Sonrası

Birinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 100 g

ÖNEMLİ: Bu dönemde birinci besleme uygulamasını takiben bir hafta sonra bakır uygulanmalıdır.



Çiçek Öncesi

İkinci Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Fosfor 100 ml
- Combi Plus 50 gr

ÖNEMLİ: İkinci bakır uygulaması veya zenk ilacı yapılacak ise meyve dönemine girmeden ikinci beslemeyi takiben bir hafta sonra uygulanmalıdır.

Meyve Dönemi

Üçüncü Yaprak Uygulaması

100 Litre su için;

- Terrabora Plus 200 g
- Agrorun Aminowork 100 g
- Agrorun Power 100 g
- Agrorun Rapidalg 100 gr

Tüm yaprak uygulamaları akşam saatlerinde, 18:00 dan sonra, yakıcı güneşi arkamıza alarak, güneşin turuncu ışıklarından faydalanarak, stolononların açıldığı süreçte yapacağız.